

کد کنترل

320

F



320F

صبح پنج شنبه
۱۳۹۹/۵/۲



«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل - سال ۱۳۹۹

علوم و مهندسی شیلات - کد (۱۳۱۱)

مدت پاسخ‌گویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۳۰۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	شماره	ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	شماره	ردیف
۱	زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)	۳۰	۱	۸	اصول نقشه‌آبزیان	۲۰	۱۷۰	۱۵۱
۲	ماهی‌شناسی	۲۰	۳۱	۹	هیدرولیکی عمومی	۲۰	۱۷۱	۱۷۱
۳	اکولوژی در راه‌ها	۲۰	۵۱	۱۰	بویایی جمعیت و ارزیابی ذخایر آبزیان	۲۰	۱۹۱	۱۹۱
۴	لیمنولوژی	۲۰	۷۱	۱۱	شیمی فرآورده‌های شیلاتی	۲۰	۲۱۱	۲۱۱
۵	تکثیر و پرورش ماهی	۲۰	۹۱	۱۲	اصول فرآوری محصولات شیلاتی	۱۵	۲۲۱	۲۲۱
۶	اصول تکثیر و پرورش ماهی	۲۰	۱۱۱	۱۳	عکلوبیولوژی فرآورده‌های شیلاتی	۲۰	۲۴۶	۲۴۶
۷	تکثیر و پرورش آبزیان	۲۰	۱۳۱	۱۴	اصول روش‌های صید آبزیان	۲۰	۲۶۶	۲۶۶
			۱۵۰	۱۵	شتاسایی آلات و ادوات صید	۱۵	۲۸۶	۲۸۶

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

حق چاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیک و...) پس از بجزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با مخالفین برابر مقررات و قوانین می‌شود.

۱۳۹۹

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود را با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ نامه و دفترچه سوالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سوالات و پائین پاسخ نامه ام را تأیید می نمایم.

امضا:

زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی):

PART A: Vocabulary

Directions: Choose the word or the phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes the blank. Then mark the correct choice on your answer sheet.

- 1- I omitted all the extraneous details while explaining the ----- of the matter to him.
1) breach 2) distinction 3) qualm 4) gist
- 2- While his brother writes in an unclear and clumsy way, Sam himself is known for his ----- style of writing.
1) lucid 2) verbose 3) dull 4) feasible
- 3- Poultry farms place the eggs into incubators to ----- the growth of the embryo into chicken.
1) conquer 2) hasten 3) outline 4) elude
- 4- With as many as three witnesses giving evidence against her, the ----- of her claim that she was innocent was in serious doubt.
1) demonstration 2) paradigm 3) veracity 4) empiricism
- 5- I did not like her way of teaching because her lecture had too many digressions; she kept on wandering to various subjects, most of them not ----- to the central idea of her topic.
1) vulnerable 2) peripheral 3) pertinent 4) loyal
- 6- With the advent of electric bulbs and emergency lights, the use of gas lamps became -----.
1) imprecise 2) repetitive 3) idealistic 4) obsolete
- 7- The employee did not believe the implausible story that Janet ----- to justify her absence from work.
1) concocted 2) scrutinized 3) manipulated 4) reassured
- 8- The doctor has advised him to ----- adhere to the prescribed regimen; otherwise, there is a danger of relapse of the illness.
1) sequentially 2) strictly 3) ineptly 4) selectively
- 9- The ----- in her speech can put off almost anyone; she urgently needs to tone down the harsh words she uses.
1) explicitness 2) enigma 3) shortsightedness 4) acerbity
- 10- He is so wasteful; he has ----- all the money that he had borrowed from me, and is now back again asking for more.
1) allocated 2) neglected 3) depleted 4) accumulated

PART B: Cloze Passage

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

Good learners work hard. A few things may come easily to learners, but most knowledge requires effort (11) ----- to put in the time. They talk with others, read more, study more and carry around when they don't understand, (12) ----- about it before they go to sleep, at the gym, on the bus. Good learners are persistent. When they fail, they carry on, (13) ----- that they will figure it out eventually. (14) -----, they learn from their mistakes. Good learners recognize (15) ----- always fun. But that does not change how much they love it.

- | | | |
|-----|--|--|
| 11- | 1) which is good learners willing
3) that good learners willing are | 2) and good learners are willing
4) willing are good learners |
| 12- | 1) thinking 2) to think | 3) they think 4) by thinking |
| 13- | 1) are confident 2) who are confident | 3) they are confident 4) confident |
| 14- | 1) Although 2) In the meantime | 3) A case in point 4) Whereas |
| 15- | 1) learning not be
3) to learn not to be | 2) that learning is not
4) learning it is not |

PART C: Reading Comprehension

Directions: Read the following three passages and choose the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark it on your answer sheet.

PASSAGE 1:

Herring are forage fish, mostly belonging to the family Clupeidae. They consume copepods, arrow worms, pelagic amphipods, mysids, and krill in the pelagic zone. Conversely, they are a central prey item or forage fish for higher trophic levels. Herring feed on phytoplankton, and as they mature, they start to consume larger organisms. They also feed on zooplankton, tiny animals found in oceanic surface waters, and small fish and fish larvae. Copepods and other tiny crustaceans are the most common zooplankton eaten by herring. Copepods are typically 1 to 2 mm long, with a teardrop-shaped body. Some scientists say they form the largest animal biomass on the planet. Copepods are very alert and evasive. They have large antennae. When they spread their antennae, they can sense the pressure wave from an approaching fish and jump with great speed over a few cm. If copepod concentrations reach high levels, schooling herrings adopt a method called ram feeding. Herrings ram feed on a school of copepods. They swim with their mouths wide open and their perculae fully expanded. Young herring mostly hunt copepods individually, by means of 'particulate feeding' or 'raptorial feeding', a feeding method also used by adult herring on larger prey items like krill. During daylight, herring stay in the safety of deep water, feeding at the surface only at night when the chance of being seen by predators is less. They swim along with their mouths open, filtering the plankton from the water as it passes through their gills. Depending on their prey, herring become filter feeders, driving several meters forward with wide open

mouth and far expanded opercula, then closing and cleaning the gill rakers for a few milliseconds.

- 16- It is stated in the passage that herrings hunt -----.
- 1) copepods through 'raptorial feeding'
 - 2) fish larvae by passing them in their gills
 - 3) forage fish for higher trophic levels
 - 4) in swarms only during the daylight
- 17- All of the following about what herrings feed on are correct except that they -----.
- 1) eat zooplankton, small fish and fish larvae
 - 2) are particularly interested in tiny crustaceans
 - 3) consume copepods, arrow worms and mysids
 - 4) usually feed only on krill before they mature
- 18- All of the following about herrings' 'ram feeding' is correct except that -----.
- 1) the pectoral fins of the herring is as open as possible
 - 2) it occurs with dense concentrations of copepod
 - 3) herrings ram feed with their mouths wide open
 - 4) the herrings' antennae is spread to its full length
- 19- The passage mentions that herrings -----.
- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1) lived in the pelagic zone | 2) are deep-water predators |
| 3) can become filter feeders | 4) have teardrop-shaped body |
- 20- The word 'evasive' in the passage (underlined) is closest to -----.
- 1) 'hurt'
 - 2) 'dare'
 - 3) 'escape'
 - 4) 'attack'

PASSAGE 2:

Agnatha is a superclass of jawless fish in the phylum Chordata, subphylum Vertebrata, consisting of both present (cyclostomes) and extinct (conodonts and ostracoderms) species. The group is sister to all vertebrates with jaws, known as gnathostomes. Agnathans are ectothermic, meaning they do not regulate their own body temperature. Agnathan metabolism is slow in cold water, and therefore they do not have to eat very much. They have no distinct stomach, but rather a long gut, more or less homogenous throughout its length. Lampreys feed on other fish and mammals. Anticoagulant fluids preventing blood clotting are injected into the host, causing the host to yield more blood. Hagfish are scavengers. They use a row of sharp teeth to break down the animal. The fact that Agnathan teeth are unable to move up and down limits their possible food types. In modern agnathans, the body is covered in skin, with neither dermal or epidermal scales. The skin of hagfish has copious slime glands, the slime constituting their defense mechanism. The slime can sometimes clog up enemy fishes' gills, causing them to die. In direct contrast, many extinct agnathans sported extensive exoskeletons composed of either massive, heavy dermal armour or small mineralized scales. Almost all agnathans, including all extant agnathans, have no paired appendages, although most do have a dorsal or a caudal fin. Some fossil agnathans, such as osteostracans and pituriaspids, did have paired fins, a trait inherited in their jawed descendants. Fertilization in lampreys is external. Mode of fertilization in hagfishes is not known. Development in both groups probably is external. There is no known parental care. Not much is known about the hagfish reproductive process. It is

believed that hagfish only have 30 eggs over a lifetime. Most species are hermaphrodites.

- 21- The passage mentions that the exoskeletons of many extinct agnathans -----.
- 1) included neither dermal or epidermal scales
 - 2) could be formed of small mineralized scales
 - 3) was composed of a long chain of slime glands
 - 4) constituted their main defense mechanism
- 22- All of the following about Agnathans are correct except that they have -----.
- 1) mostly a dorsal or a caudal fin
 - 2) limited food types available to them
 - 3) a stomach spread through their length
 - 4) almost 30 eggs over a lifetime
- 23- It is stated in the passage that hagfish species -----.
- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1) are often hermaphrodites | 2) clog up enemy fishes' gills |
| 3) have a heavy dermal armour | 4) belong to ostracan species |
- 24- The passage points to the fact that conodonts species of Agnatha -----.
- 1) had a skinned body
 - 2) were jawed
 - 3) no longer exist
 - 4) had large fins
- 25- The word 'scavenger' in the passage (underlined) refers to eating mostly -----.
- 1) dead animals
 - 2) fish and plants
 - 3) other animals
 - 4) small fish

PASSAGE 3:

Small pelagic fish live in the open water, so unlike demersal or reef fish, they cannot hide among kelp, or in crevices in coral, or under rocks on the bottom. This leaves them vulnerable to attack by large predatory fish, as well as other predators, such as marine mammals and seabirds. As a result, small pelagic fish usually aggregate in schools for protection. Schooling fish have evolved sophisticated evasion techniques. When they school, they have many eyes, making ambush difficult; and their silvery bodies dazzle, making it difficult for predators to pick out individual fish. They react to movements from a predator with lightning reflexes, rhythmically streaming up and down with rapid direction changes. When a predator approaches, they can split and reform behind the predator. During the final stages of an attack, they can explosively disband in all directions and then just as rapidly reform. Defensive manouevres like these appear to be choreographed, though they are not. Within the school itself, there is no centralized intelligence aware of how the school has configured itself. Rather, the schooling behaviour is the emergent consequence of relatively simple rules followed by each individual fish in the school, such as remaining close together, moving in the same direction, and avoiding collisions with each other. Some species of forage fish, driven by nutrient availability and their life-cycle stage, form vast schools at predictable locations and times of the year. Normally, schooling works well as protection from occasional predators. Fish schooling in vast numbers may attract correspondingly huge numbers of predators, including seabirds, sharks, tuna, billfish, pods of dolphins, and killer and humpback whales. Aggregations of predators on such a scale means the schools can be attacked on all sides and panicked into forming bait balls.

- 26- Which of the following about a small pelagic fish school is correct?**
- 1) Its sophistication depends of the type of the predator.
 - 2) Its shape does not follow a centralized intelligence.
 - 3) It follows the movements of one single 'lead fish'.
 - 4) It causes only a few collisions within the school.
- 27- The passage points to the fact that -----.**
- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 1) pelagic fish have many eyes | 2) demersal in crevices in coral |
| 3) fish often aggregate in schools | 4) predatory fish are vulnerable |
- 28- All of the following about fish schooling are correct except that it -----.**
- 1) may end up in forming into forming bait balls
 - 2) protects only against the occasional predator
 - 3) attracts predators such as sharks and dolphins
 - 4) often develops inside unpredictable locations
- 29- Schools of small pelagic fish react to a predator in all the following ways except that they -----.**
- 1) split and reform behind the predator
 - 2) make the predator temporarily blind
 - 3) shift to darker colors to frighten predators
 - 4) change their direction very quickly
- 30- The word 'pick out' in the passage (underlined) is closest to -----.**
- 1) 'choose'
 - 2) 'consume'
 - 3) 'attack'
 - 4) 'hurt'

ماهی‌شناسی:

- ۳۱- ماهی با سه جفت سبیلک، خار زیرچشمی و دهان زیرین به کدام خانواده تعلق دارد؟
- | | | | |
|---------------|---------------|------------------|--------------------|
| Cobitidae (۴) | Sisoridae (۲) | Scorpaenidae (۲) | Gasterosteidae (۱) |
|---------------|---------------|------------------|--------------------|
- کدام خانواده از ماهیان، دارای نمایندگانی در دریای خزر، خلیج فارس و آبهای داخلی هستند؟
- | | | | |
|---------------|---------------|--------------------|-----------------|
| Siluridae (۴) | Clupeidae (۳) | Carcharhinidae (۲) | Anguillidae (۱) |
|---------------|---------------|--------------------|-----------------|
- ۳۲- کدام گروه ماهیان، تنها یک جنس و یک گونه در ایران دارند؟
- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Channidae – Mastacembelidae (۲) | Anguillidae – Siluridae (۱) |
|---------------------------------|-----------------------------|
- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Siluridae – Bagridae (۴) | Mastacembelidae – Sisoridae (۳) |
|--------------------------|---------------------------------|
- ۳۳- تخمک‌های کدام گروه از ماهیان آبهای داخلی ایران بعد از مرحله سوم رسیدگی جنسی، سمی هستند؟
- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| Carassius – Silurus (۲) | Capoeta – Schizothorax (۱) |
|-------------------------|----------------------------|
- | | |
|-------------------------|------------------------|
| Squalius – Alburnus (۴) | Cyprinus – Rhodeus (۳) |
|-------------------------|------------------------|
- ۳۴- باله شکمی کدام گونه از ماهیان آبهای داخلی ایران زوج نیست؟
- | | |
|--------------|----------------------------|
| Liza abu (۲) | Gasterosteus aculeatus (۱) |
|--------------|----------------------------|
- | | |
|--------------------|----------------------|
| Silurus glanis (۴) | Ponticola cyrius (۳) |
|--------------------|----------------------|
- ۳۵- کدام ماهیان به جای فلس، صفحات استخوانی دارند؟
- | |
|---|
| Anguilla anguilla – Benthophilus leobergi (۱) |
|---|
- | |
|--|
| Chana gachua – Mastacembelus mastacembelus (۲) |
|--|
- | |
|---|
| Perca fluviatilis – Neogobius fluviatilis (۳) |
|---|
- | |
|---|
| Syngnathus abaster – Gasterosteus aculeatus (۴) |
|---|

- ۳۷ - دندان حلقی ماهی کلمه و ماهی حوض چند ردیفی است؟
 ۱) دو ردیفی - یک ردیفی
 ۲) یک ردیفی - دو ردیفی
 ۳) یک ردیفی - یک ردیفی
 ۴) دو ردیفی - دو ردیفی
- ۳۸ - کدام گونه دارای ۴ سبیلک رشته‌ای در یک مقطع عرضی است؟
Acipenser nudiventris (۲)
Luciobarbus mursa (۴)
Huso huso (۱)
Acipenser persicus (۳)
- ۳۹ - ماهیان "Chondrostei" چه ویژگی‌هایی دارند؟
 ۱) فلس‌های گانوئید و دم هتروسرکال
 ۲) فلس‌های پلاکوئید و دم هتروسرکال
 ۳) کوچک‌ترین گونه ماهیان خاویاری کدام است؟
 ۴) فلس‌های گانوئید و عدم وجود اسپیراکل
- ۴۰ - کدام گونه مهاجر ماهیان دریای خزر، مولدین پس از تخم‌ریزی می‌میرند؟
Acipenser ruthenus (۲)
Acipenser stellatus (۴)
Acipenser persicus (۱)
Acipenser nudiventris (۳)
- ۴۱ - کدام گونه مهاجر ماهیان دریای خزر، مولدین پس از تخم‌ریزی می‌میرند؟
Huso huso (۲)
Caspiomyzon wagneri (۱)
Vimba persa (۴)
Rutilus caspicus (۳)
- ۴۲ - کدام گونه فاقد اندام مکنده یا دیسک مانند است؟
Gobio gobio (۲)
Glyptothorax kurdistanicus (۴)
Garra rufa (۱)
Ponticola cyrius (۳)
- ۴۳ - کدام ماهی دارای زوائد پیلوریک نیست؟
 ۱) تاس‌ماهی ایرانی
 ۲) کفال خاکستری
 ۳) گاو‌ماهی ایرانی
 ۴) ماهی کاد
- ۴۴ - در کدام گروه از ماهیان، بیضه‌ها با کلیه ارتباط ندارند؟
 ۱) آمیا
 ۲) ازوون برون
 ۳) پروتوپتروس
 ۴) لامپری
- ۴۵ - کدام خانواده از ماهی‌های آب‌های داخلی ایران، بیشترین گونه بومزاد را دارند؟
Gobiidae (۴)
Cichlidae (۳)
Cyprinidae (۲)
Aphaniidae (۱)
- ۴۶ - محل استقرار غده اروفیز در کدام بخش است؟
 ۱) انتهای ستون مهره
 ۲) دیواره لوز المعده
 ۳) زیر غده هیپوفیز
 ۴) داخل کلیه
- ۴۷ - بالغین کدام خانواده از تخم‌هایشان تا زمان تخم‌گشایی نوزادان در دهان محافظت می‌کنند؟
Apogonidae (۴)
Balistidae (۳)
Belonidae (۲)
Cynoglossidae (۱)
- ۴۸ - کدام بخش مغز در ایجاد هماهنگی و ارتباط میان پیام‌های واردشونده و خارج‌شونده در ماهیان نقش دارد؟
 ۱) خلفی
 ۲) رابط
 ۳) قدامی
 ۴) میانی
- ۴۹ - در کدام خانواده‌ها وجود Adipose fin در کدام خانواده‌ها وجود ندارد؟
Engraulidae – Labridae (۲)
Osmceroidae – Siluridae (۴)
Ariidae – Myctophidae (۱)
Characidae – Ariidae (۳)
- ۵۰ - در مورد تفاوت‌های موجود بین لامپری و هگ‌فیش، گزینه صحیح کدام است؟
 ۱) تخم‌ها در لامپری بسیار بزرگ و دارای قلاب و در هگ‌فیش کوچک و بدون قلاب است.
 ۲) عمل شکافتگی جنین در لامپری Holoblastic و در هگ‌فیش Meroblastic است.
 ۳) خط جانبی در لامپری وجود ندارد و در هگ‌فیش به خوبی توسعه یافته است.
 ۴) روده لامپری‌ها فاقد مزه و در هگ‌فیش مزه دارد.

اکولوژی دریاها:

- ۵۱- تغییرات زمانی (روزانه و فصلی) نور و دما، در کدام ناحیه از اکوسیستم‌های دریائی و اقیانوسی بیشتر است؟
 Mesopelagic (۴) Epipelagic (۳) Bathypelagic (۲) Abyssopelagic (۱)
- ۵۲- کدام مورد از دیاتومه‌ها دیواره سلولی ضخیم و سنگین‌تری دارد؟
 (۱) آب شیرین (۲) آب‌های کم عمق (۳) بنتیک
 (۴) پلانکتونی
- ۵۳- کدام گروه از فیتوپلانکتون‌ها، جزو گروه شاخص نانوپلانکتون‌ها هستند؟
 (۱) جلبک‌های سبز (۲) دیاتومه‌آ (۳) دینوفلزالاتا (۴) کوکولیتوفورا
- ۵۴- توانایی تحمل تغییرات فیزیکی و شیمیایی محیط در آبیان کدام ناحیه از اکوسیستم‌های دریائی و اقیانوسی بیشتر است؟
 Sublittoral (۴) Mesopelagic (۳) Littoral (۲) Deep sea (۱)
- ۵۵- گزینهٔ صحیح در مورد میزان اکسیژن محلول در آب دریاهای و اقیانوس‌ها کدام است؟
 (۱) با افزایش عرض جغرافیایی، میزان اکسیژن آب‌های سطحی افزایش می‌یابد.
 (۲) با افزایش عرض جغرافیایی، میزان اکسیژن محلول آب‌های سطحی کاهش می‌یابد.
 (۳) غلظت اکسیژن محلول در آب دریاهای و اقیانوس‌ها، با طول جغرافیایی در ارتباط است.
 (۴) غلظت اکسیژن محلول در آب دریاهای و اقیانوس‌ها، تحت تأثیر طول و عرض جغرافیایی نیست.
- ۵۶- کدام گروه تغذیه‌ای از ساکنین جنگل‌های مانگرو، در دوام زنجیره غذایی در این اکوتون نقش کلیدی و حیاتی دارد؟
 (۱) پوده‌خواران (۲) شکارچیان (۳) معلق خواران (۴) همه‌چیزخواران
- ۵۷- کدام عامل محیطی در توسعه و پراکندگی جغرافیایی جنگل‌های کلپ نقش ندارد؟
 (۱) بستر ماسه‌ای (۲) پدیده فراگوشی (۳) جریانات آب سرد (۴) شفافیت آب
- ۵۸- منشأ اصلی مواد آلی محلول در آب‌های دریائی، کدام است؟
 (۱) بارش‌های جوی (۲) چشمهدای آب گرم عمقی
 (۳) فعالیت‌های بیولوژیکی (۴) ورود زه‌آب‌ها
- ۵۹- مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده نوع و فراوانی ماکرو جلبک‌ها در سواحل صخره‌ای، کدام است؟
 (۱) اثر امواج (۲) اندازه بستر (۳) درجه حرارت آب (۴) ورود رواناب‌ها
- ۶۰- وجه تشابه جنگل‌های کلپ و آبسنگ‌های مرجانی کدام است؟
 (۱) هردو در عرض‌های جغرافیایی یکسانی قرار دارند.
 (۲) هردو در طول‌های جغرافیایی یکسانی قرار دارند.
 (۳) هر دو کم تولید بوده و توبوگرافی سه بعدی آن‌ها باعث جذب کم بی‌مهرگان و ماهیان می‌شود.
 (۴) هردو پر تولید بوده و توبوگرافی سه بعدی آن‌ها باعث جذب زیاد بی‌مهرگان و ماهیان می‌شود.
- ۶۱- علف‌های دریایی بیشتر به کدام حالت، توسط موجودات دریایی مورد مصرف قرار می‌گیرند؟
 (۱) عدم ارزش غذایی و عدم استفاده از آن (۲) بیشتر به صورت علوفه در حال تجزیه شدن
 (۳) فقط استفاده توسط باکتری‌ها و فارچ‌ها (۴) علوفه‌های دریایی تازه و به صورت مستقیم
- ۶۲- منابع غذایی اصلی جوامع کفازی دریا عبارتند از پلانکتون‌های زنده، دتریت و مواد آلی محلول (DOM)، اگر مقدار پلانکتون‌های زنده را یک واحد در نظر بگیریم، مقدار دو منبع دیگر به ترتیب چقدر است؟
 (۱) (۱۰ تا ۵۰۰) - (۵۰۰ تا ۱۰۰) (۲) (۱۰ تا ۱۰۰) - (۱۰۰ تا ۵۰۰)
 (۳) (۱۰ تا ۵۰) - (۵۰ تا ۱۰) (۴) (۵۰ تا ۱۰) - (۱۰ تا ۵۰)

- ۶۳- چگونه فیتوپلانکتون‌ها، نور جذب نشده توسط سایر گونه‌های فیتوپلانکتونی را جذب می‌کنند؟

- ۱) با همزیستی با باکتری‌ها
- ۲) با تغییر عمق محل قرارگیری
- ۳) با رنگدانه‌های متفاوت
- ۴) با تغییر سایز بدن

- ۶۴- تفاوت جوامع پلانکتونی آب‌های غیرحاصل خیز با آب‌های حاصل خیز، کدام است؟

- ۱) پلانکتون‌های آب‌های غیرحاصل خیز، سایز کوچک‌تر دارند.

۲) پلانکتون‌های آب‌های غیرحاصل خیز، در جذب مواد و تولید ناکارآمدتر هستند.

۳) در آب‌های غیرحاصل خیز، اهمیت گونه‌های گوشتخوار نسبت به آب‌های حاصل خیز کمتر است.

۴) نسبت تولید سالیانه به بیومس پلانکتون‌های آب‌های غیرحاصل خیز بیشتر از آن چیزی است که در مورد پلانکتون‌های مناطق حاصل خیز دیده می‌شود.

- ۶۵- در دریا نرخ تنفس با تغییر عمق چندان تغییر پیدا نمی‌کند. استثنایی که در این زمینه می‌تواند به وجود آید، کدام است؟

- ۱) هرچا که نرخ تولید کمتر باشد، نرخ تنفس بیشتر می‌شود.

۲) کمبود مواد مغذی می‌تواند باعث تغییر نرخ تنفس با عمق شود.

۳) در سطحی ترین لایه‌های آب تنفس نوری می‌تواند نرخ تنفس را افزایش دهد.

۴) نرخ تنفس وابسته به عمق است، از این‌رو تغییر آن با عمق به طور طبیعی همیشه وجود دارد.

- ۶۶- در حدفاصل بین لایه هوایی سطحی و لایه عمیق‌تر بی‌هوایی رسوبات دریا، چه تغییری اتفاق می‌افتد؟

- ۱) پتانسیل اکسیداسیون - احیا به شدت تغییر می‌کند.


۲) یون نیترات به حداقل غلظت خود می‌رسد.

۳) مقدار pH افزایش می‌یابد.


- ۶۷- کدام عامل، بر میزان تولید اولیه در دریا مؤثر نیست؟

- ۱) اختلاط آب لایه‌های مختلف
- ۲) چرا توسط زئوپلانکتون‌ها

۴) در دسترس بودن مواد مغذی



- ۶۸- شکل‌های a و b به ترتیب (از راست به چپ) ساختار دمایی کدام دریاها را در گرم‌ترین زمان سال نشان می‌دهد؟



- ۱) دریاهای گرمسیری و قطبی

۲) دریاهای گرمسیری و معتدل

۳) دریاهای معتدل و قطبی

۴) دریاهای قطبی و معتدل

- ۷۰ در فراوانی پایین گیاه خواران، تراکم بالای باکتری‌های سولفوره و غالبیت دپوزیت فیدرها، مربوط به کدام نوع سواحل دریاچی است؟

(۱) صخره‌ای (۲) گلی (۳) شنی (۴) مرجانی

ليمنولوژی:

- ۷۱ با نزدیک شدن امواج به ساحل، طول موج و ارتفاع موج می‌باید و موج به طرف ساحل شکسته می‌شود.

(۱) افزایش - افزایش (۲) افزایش - کاهش (۳) کاهش - افزایش (۴) کاهش - کاهش

- ۷۲ رنگ سیاه رسوبات در هیپولیمنیون دریاچه‌ها به واسطه وجود کدام ترکیب است؟

(۱) اکسید آهن (۲) سولفید آهن (۳) سولفات آهن (۴) فسفات آهن

- ۷۳ در دریاچه‌های مناطق معتدل، میزان ثبیت نیتروژن در فصل زمستان چگونه تغییر می‌کند؟

(۱) افزایش می‌باید. (۲) تغییر نمی‌کند.

(۳) کاهش می‌باید. (۴) ثبیت نیتروژن ارتباطی با فصول سال ندارد.

- ۷۴ اگر نزوجت آب در دمای صفر درجه سانتی گراد را 100° درصد بگیریم، در چه دمایی بر حسب درجه سانتی گراد این نزوجت به 5° درصد می‌رسد؟

(۱) ۵ (۲) ۱۵ (۳) ۲۵ (۴) ۴۵

- ۷۵ کدام ویژگی مربوط به آب‌های جاری است؟

(۱) تبادلات اکسیژنی ناچیز با اتمسفر

(۲) لایه‌بندی حرارتی ناپایدار

(۳) عدم تشکیل طبقات عمودی اکسیژنی

- ۷۶ کدام قسمت منطقه لیتووال، بیشترین شباهت را با آب‌های جاری دارد؟

(۱) Eulitoral (۲) Epilitoral (۳) Infralitoral (۴) Supralitoral

- ۷۷ دریاچه‌های چند چرخه‌ای گرم، در چه مناطقی دیده می‌شوند و زمان چرخش‌های آن کدام است؟

(۱) حاره - خنک شدن‌های شباهن

(۲) حاره - زمستان

(۳) کوهستانی - تابستان

(۴) کوهستانی - فواصل زمانی نامشخص

- ۷۸ در منطقه هیپولیمنیون دریاچه‌های پرتولید، بیشترین میزان مصرف اکسیژن توسط کدام‌یک است؟

(۱) باکتری‌ها (۲) زوپلانکتون‌ها (۳) کفزیان (۴) نکتون‌ها

- ۷۹ دریاچه‌ای فرضی در ارتفاع 5400 متری از سطح دریا در مناطق حاره قرار دارد، این دریاچه از نظر میزان تولید و گردش‌های فصلی چگونه است؟

(۱) الیگوتروف - کم گردشی

(۲) الیگوتروف - چند گردشی

(۳) یوتروف - کم گردشی

- ۸۰ کدام گزینه در مورد تأثیر فشار بر دمای حداکثر وزن مخصوص آب درست است؟

(۱) با افزایش فشار دمای حداکثر، وزن مخصوص آب افزایش می‌باید.

(۲) با افزایش فشار دمای حداکثر، وزن مخصوص آب کاهش می‌باید.

(۳) با کاهش فشار دمای حداکثر، وزن مخصوص آب کاهش می‌باید.

(۴) با کاهش فشار دمای حداکثر، وزن مخصوص آب افزایش می‌باید.

- ۸۱- تغییرات pH در طی سکون تابستانه در اپیلیمنیون دریاچه‌های الیگوتروف و یوتروف به ترتیب چگونه است؟
 ۱) زیاد - کم ۲) زیاد - کم ۳) کم - کم ۴) کم - زیاد
- ۸۲- در کدام دریاچه نیتروژن می‌تواند به عنوان عنصر محدود کننده تولید، تلقی شود؟
 ۱) دریاچه‌های یوتروف در ساعت بعد از ظهر
 ۲) دریاچه‌های یوتروف در زمان سکون تابستانه
 ۳) دریاچه‌های دریافت کننده فاضلاب‌های حاوی فسفر
 ۴) دریاچه‌های دریافت کننده فاضلاب‌های حاوی مواد آبی به صورت ناگهانی
- ۸۳- پایداری لایه‌بندی حرارتی در کدام دامنه دمایی بیشتر است و علت آن کدام است؟
 ۱) در دامنه دمایی پایین‌تر - به دلیل چگالی غیر معمول آب
 ۲) در دامنه دمایی بالاتر - به دلیل اختلاف چگالی بیشتر
 ۳) در دامنه دمایی بالاتر - به دلیل افزایش حجم مخصوص
 ۴) در دامنه دمایی پایین‌تر - به دلیل چگال‌تر بودن در دمای پایین
- ۸۴- کدام مورد در دریاچه‌های کم تولید و شفاف، بیوماس غالب را تشکیل می‌دهد؟
 ۱) گیاهان عالی آبری ۲) جلبک‌ها ۳) فیتوپلانکتون ۴) رئوپلانکتون
- ۸۵- در زمان تشکیل لایه ترمولکلاین کدام یک از عناصر، در پتانسیل احیایی بالاتر آزاد می‌شوند؟
 ۱) آهن ۲) گوگرد ۳) فسفر ۴) منگنز
- ۸۶- کریستال‌های آهکی تولید شده در ناحیه Epilimnion دریاچه‌های پر تولید در نهایت چه خواهد شد؟
 ۱) به تدریج در ناحیه Profundal رسوب خواهد شد.
 ۲) به عنوان منبع کلسیم به وسیله سخت پوستان دریافت خواهد شد.
 ۳) به وسیله امواج به ناحیه littoral انتقال یافته و رسوب خواهد شد.
 ۴) به شکل بی کربنات کلسیم محلول در ناحیه Hypolimnion ذخیره خواهد شد.
- ۸۷- در چه زمانی دمای آب نهرهای کوهستانی واستگی کمتری به دمای محیط اطراف دارد؟
 ۱) ابتدای بهار ۲) ابتدای تابستان ۳) ابتدای پاییز ۴) ابتدای زمستان
- ۸۸- کدام مورد، در دریاچه‌های فاقد پروفیل عمودی و متغیر است؟
 ۱) اکسیژن ۲) سولفات ۳) درجه حرارت ۴) دی‌اکسید کربن
- ۸۹- پلانکتون‌ها برای باقیماندن در ناحیه تولیدی دریاچه‌ها از چه ویژگی استفاده می‌کنند؟
 ۱) افزایش ویسکوزیته آب ۲) کاهش مقاومت فرم ظاهری ۳) کاهش اختلاف وزن مخصوص با آب
- ۹۰- کدام ترکیب به صورت کلولیدی در آب مشاهده می‌شود؟
 ۱) فسفات آهن ۲) اسید سیلیسیک ۳) بی‌کربنات کلسیم ۴) بی‌کربنات آهن

تکثیر و پرورش ماهی:

- ۹۱- کدام مکانیزم از ایجاد پلی‌اسپرمی در هنگام لفاح در ماهیان جلوگیری می‌کند؟
 ۱) واکنش کورتیکالی ۲) تعداد میکروپلیل ۳) وجود آکروزوم
 ۴) حرکت هسته به سمت قطب حیوانی

- ۹۲- تأثیر ورود ادرار به مایع اسپرمی، در حین اسپرم کشی کدام است؟
 ۱) تأخیر اسمولالیته اسپرم
 ۲) تأخیر آغاز حرکت اسپرم
 ۳) افزایش ذخایر ATP
 ۴) افزایش شدت حرکت اسپرم
- ۹۳- بعد از چشمزدگی تخم قزل آلا به آن ها شوک داده می شود. دلیل آن کدام است؟
 ۱) جلوگیری از مرگ و میر تخمها
 ۲) ایجاد تریپلولوئیدی در تخم
 ۳) ایجاد تغییر جنسیت
 ۴) شناسایی و حذف تخم های مرده
- ۹۴- تشخیص جنسیت کدام ماهی حتی در زمان تولید مثل مشکل است؟
 ۱) قزل الای رنگین کمان
 ۲) قره برون
 ۳) کپور نقره ای
 ۴) ماهی سفید دریای خزر
- ۹۵- کدام ماهی دارای استراتژی تخمربزی غیرهمزمان است؟
 ۱) فیل ماهی
 ۲) فیتوفانگ
 ۳) قزل الای
 ۴) سس ماهی
- ۹۶- جنسیت نوزادان تولیدی در قزل الای رنگین کمان بیشتر تحت تأثیر کدام مورد است؟
 ۱) طول دوره انکوباسیون
 ۲) سن مولد
 ۳) اندازه مولد
 ۴) نوع انکوباتور
- ۹۷- مهم ترین عامل محدود کننده پرورش در قفس در آب شور در مقایسه با آب شیرین کدام است؟
 ۱) دما و شوری آب
 ۲) جریانات و تعویض آب
 ۳) حضور بیوفولرها و خوردگی
 ۴) کدام عامل نقش مهم تری در ارزیابی کیفیت تخمک ماهیان مولد قزل آلا دارد؟
 ۱) اندازه تخمک
 ۲) ترکیبات شیمیایی تخمک
 ۳) وزن ماهیان مولد
 ۴) زمان استحصال تخمک پس از اوولاسیون
- ۹۸- ضریب غذائی متعادل برای ماهیان کپور علفخوار - کپور معمولی به ترتیب چقدر است؟
 ۱) ۱ و ۳
 ۲) ۲ و ۲۰
 ۳) ۳ و ۲۵
 ۴) ۴ و ۱۰
- ۹۹- مناسب ترین منبع غذایی لاروها در استخراهای نوزادگاهی کپور ماهیان پس از کاهش جمعیت رو تیفر استخر کدام است؟
 ۱) دافنی ها
 ۲) سیکلولپس ها
 ۳) لارو سنجاقک ها
 ۴) غذای کنسانتره دستی
- ۱۰۰- میزان غذای مورد نیاز ماهیان پرورشی به کدام عوامل بستگی دارد؟
 ۱) سن - وزن - دمای آب
 ۲) وزن - کیفیت غذا - سن
 ۳) وزن - دمای آب - کیفیت غذا
- ۱۰۱- علائم ظاهری ماهی مولد خاویاری ماده رسیده و مناسب جهت تکثیر مصنوعی کدام است؟
 ۱) پشت ماهی از فربهی برخوردار باشد.
 ۲) پایه باله دمی قطور و عریض تر باشد.
 ۳) شکم نرم، آویخته و ارتجاعی باشد.
- ۱۰۲- مهم ترین مشکل استفاده از هورمون GnRHa برای القاء تکثیر ماهیان چیست؟
 ۱) گران بودن
 ۲) حذف سریع از گردش خون
 ۳) عدم پاسخدهی مناسب در آزاد ماهیان
 ۴) کاهش قابل ملاحظه درصد لقاد
- ۱۰۳- در اغلب مراکز تکثیر کپور ماهیان در ایران، از کدام روش تکثیر استفاده می شود؟
 ۱) ترکیبی از چینی و مجاری
 ۲) چینی
 ۳) مجاری
- ۱۰۴- سرعت رشد کدام گونه در سیستم های پرورش، از بقیه بیشتر است؟
Oncorhynchus mykiss (۲)
Ctenopharyngodon idella (۴)
- ۱۰۵- *Huso huso* (۱)
Cyprinus carpio (۳)

- ۱۰۶- لقاح منواسپرمی از پلی اسپرمی در ماهیان خاویاری با کدام مورد مشخص می‌شود؟
 ۱) تغییر رنگ تخم به سفید شیری
 ۲) اندازه نامترانه بلستومرها
 ۳) تقسیم نامنظم ۳، ۵، ۷ تایی بلستولا
 ۴) تقسیم منظم ۲، ۴، ۸، ۱۶ تایی بلستولا
- ۱۰۷- رایج‌ترین مشکل تولید مثلی ماهیان پرورشی، کدام است؟
 ۱) عدم تخم‌زی متاعقب تزریق هورمون
 ۲) عدم بلوغ نهایی اووسیت
 ۳) عدم زرددهسازی
 ۴) هم‌آوری پایین
- ۱۰۸- مهم‌ترین عیب هورمون $G_{II}RH$ در تکثیر ماهیان مولد کدام است؟
 ۱) عدم کارایی مناسب
 ۲) دسترسی سخت مصرف کنندگان
 ۳) نیاز به آنتی دوپامین در برخی گونه‌ها
 ۴) ایجاد پاسخ ایمنی در ماهی دریافت کننده هورمون
- ۱۰۹- کدام ماهیان به تزریق HCG در تکثیر جواب بهتری می‌دهند؟
 ۱) کامل‌رسيده مهاجر، دریائی و ماهی خوار
 ۲) پرورشی سرد آبی و گرم آبی
 ۳) تغذیه شده با غذای مصنوعی
 ۴) در حال رسیدگی
- ۱۱۰- استفاده از سیستم استوانه‌ای شکل از نوع Drum بیشتر به کدام منظور در سیستم‌های پرورش ماهیان سرد آبی استفاده می‌شود؟
 ۱) نوعی بیوفیلتر
 ۲) تبادلات یونی ذرات
 ۳) حذف مکانیکی ذرات ریز
 ۴) رفع کامل ذرات غذا

اصول تکثیر و پرورش ماهی

- ۱۱۱- سخت شدن پوسته تخم در آزاد ماهیان، به وجود کدام یون بستگی دارد؟
 ۱) آهن
 ۲) سدیم
 ۳) کلسیم
 ۴) منیزیم
- ۱۱۲- به تعداد تخم‌ها در واحد وزن ماهی چه می‌گویند؟
 ۱) هماوری کارکردی
 ۲) هماوری وزنی
 ۳) هماوری نسبی
 ۴) هماوری مطلق
- ۱۱۳- بازگشت به محل تولد در زمان تخم‌زی ماهی‌ها (Homing migration)، در کدام شکل مهاجرت دیده می‌شود؟
 ۱) اقیانوس کوچ
 ۲) دریا - رود کوچ
 ۳) دریا کوچ
 ۴) رود کوچ
- ۱۱۴- هم‌اکنون سهم آبزی پروری از کل تولید جهانی آبزیان، چند درصد است؟
 ۱) ۱۰٪
 ۲) ۳۰٪
 ۳) ۵۰٪
- ۱۱۵- کدام گروه از ماهیان از دریا به آبهای لب‌شور نیز مهاجرت دارند؟
 ۱) کفال، خامه ماهی، شانک
 ۲) کفال، کپور معمولی، آمور
 ۳) تیلاپیا، کپور معمولی، سفید
- ۱۱۶- در محور تولیدمثلی به ترتیب کدام موارد مسئول تنظیم عملکردهای جنسی در ماهیان هستند؟
 ۱) هیپوتالاموس، گناد، هیپوفیز
 ۲) هیپوفیز، گناد، هیپوتالاموس
 ۳) گناد، هیپوفیز، هیپوتالاموس
- ۱۱۷- برای تغییر جنسیت ماهی تیلاپیای نیل از کدام هورمون استفاده می‌شود؟
 ۱) پروگنولون
 ۲) استروژن
 ۳) β -استرادیول
 ۴) α -متیل تستوسترون

- ۱۱۸- کدام گیاه، نقش کمتری در جلوگیری از تابش نور به عمق آب دارد؟
 ۱) سالونیا ۲) لمنه آ ۳) میریوفیلوم
 ۴) نی
- ۱۱۹- تنظیم pH در استخرهای گرمابی، در چه دامنه‌ای بهتر است؟
 ۱) ۱/۲-۶/۸ ۲) ۴/۵-۸/۵ ۳) ۴/۳-۱۱/۲
 ۴) ۷/۲-۸/۶
- ۱۲۰- در یک استخر پرورش ماهی گرمابی، درصد بچه ماهی ورودی به استخر برای آمور، فیتوفاغ، بیگ هد و کپور معمولی به ترتیب، کدام است؟
 ۱) ۱۵، ۵۰، ۲۰، ۴۰ ۲) ۱۵
 ۳) ۲۰، ۱۰، ۴۰، ۳۰ ۴) ۱۰، ۱۰، ۷۰، ۱۰
- ۱۲۱- کدامیک از یون‌ها در فرایند لقاح، نقش مهم‌تری دارند؟
 ۱) فسفر و منیزیم ۲) فسفر و کلسیم ۳) کلسیم و پتاسیم ۴) کلسیم و منیزیم
- ۱۲۲- در استخرهای پرورش ماهی گرمابی، کارامدترین روش حذف نیتروژن آمونیاکی، بهره‌گیری از کدام مورد است؟
 ۱) اکسیداسیون آب ۲) باکتری‌های هتروتروف ۳) باکتری‌های نیتریفیکانت ۴) چرخش آب در استخر
- ۱۲۳- کدام ماهیان، کاتادروموس هستند؟
 ۱) آزاد ماهیان ۲) کفال ماهیان ۳) مار ماهیان ۴) ماهیان خاویاری
- ۱۲۴- فرایندی که موجب تغییرات آهسته در فیزیولوژی ماهی می‌شود، به طوری که بتواند در مقابل تغییرات pH و دما سازش پیدا کند کدام است؟
 ۱) Migration ۲) Smoltification ۳) Enrichment ۴) Acclimatization
- ۱۲۵- در «Smoltification» ماهی آزاد، تبدیل **Parr** به **Smolt** با چه تغییراتی همراه است؟
 ۱) حذف سلول‌های کلراید، ایجاد نوارهای عمودی و حرکت مخالف جریان آب
 ۲) توسعه سلول‌های کلراید، ناپدید شدن رنگدانه‌های سیاه و حرکت موافق جریان آب
 ۳) توسعه سلول‌های کلراید، ایجاد نوارهای عمودی و حرکت مخالف جریان آب
 ۴) حذف سلول‌های کلراید، ناپدید شدن رنگدانه‌های سیاه و حرکت موافق جریان آب
- ۱۲۶- اصطلاح «Hermaphroditism- Sequential- Protandrous» مربوط به کدام ماهیان است؟
 ۱) تک جنسی- همزمان - دگر لقاح ۲) دو جنسی - همزمان - خود لقاح
 ۳) تک جنسی - غیر همزمان - ابتدا ماده ۴) دو جنسی - غیر همزمان - ابتدا نر
- ۱۲۷- کدام گروه از گیاهان شناور در دریاچه‌ها و رودخانه‌های بزرگ با جریان کم هستند؟
 ۱) پیستالیا، هیدریلا، عدسک آبی ۲) ایکورینا، پیستالیا، سالونیا
 ۳) عدسک آبی، تیفا، سالونیا ۴) والبس نریا، هیدریلا، ایکورینا
- ۱۲۸- در عملیات زیست سنجی ماهیان، رعایت کدام مورد ضروری است؟
 ۱) بی‌هوش کردن ماهی ۲) خالی بودن معده ماهی
 ۳) خنک بودن هوای ۴) کاهش آب استخر
- ۱۲۹- ترتیب صحیح مراحل چرخه زیستی ماهی آزاد اقیانوس اطلس (*Salmo salar*) کدام است؟
 ۱) Salmon ← Smolt ← Parr ← Fry ← Alevin ۲) Salmon ← Smolt ← Parr ← Alevin ← Grilse
 ۳) Grilse ← Parr ← Smolt ← Fry ← Alevin ۴) Alevin ← Salmon ← Parr ← Smolt ← Grilse

- ۱۳۰- تخم ماهی قزل آلای رنگین کمانی از کدام نوع است؟

نکتیں و پروردش آبزیان:

- ۱۳۱ تأثیر قطع پایه چشمی در تولید مثل میگوی سفید غربی، کدام است؟

 - ۱) افزایش فاصله زمانی بین دو پوست‌اندازی
 - ۲) افزایش زمان بین دو تخم‌ریزی
 - ۳) کاهش دفعات تخم‌ریزی
 - ۴) کاهش میزان همایوری در هر مرحله تخم‌ریزی

- ۱۳۲- در مورد اسپرم میگوی وانامی، گزینه درست کدام است؟
۱) اسپرم قابلیت حرکت ندارد.

- ۲) تماس با آب منجر به حرکت اسپرم می‌شود.
 - ۳) حرکت اسپرم توسط مژک‌های دمی کنترل می‌شود.
 - ۴) چرخش دورانی اسپرم توسط مژک‌های سری کنترل نمی‌شود.

- ۱۴۳ پیش‌رفته‌ترین لارو خارج شده از تخم در کدام آبزیان مشاهده می‌شود؟

Penaeus spp. (♂)

Astacus spp. (3)

Macrobrachium sp. (f)

Homarus sp. (♂)

- ۱۳۴- وجود شش عدد خار دمی و شکل‌گیری ماندیبول، از ویژگی‌های تشخیصی کدام مرحله لاروی میگویی و اسامی است؟

- ۱۳۵- قدرت خنثی کنندگی کدام شکل آهک در مدیریت H_p خاک استخراج میگوها بیشترین است؟

- ۱۳- سطح کدام یون در همولنف میگوها تحت تأثیر میزان شوری محیط قرار نمی گیرد؟

- ۱۰) یون پاسیم ۱۱) یون سوچاٹ ۱۲) یون تکسیم

- ۱۴۷) عدای مناسب اعازین و شروع تعدیه حارجی مرحله لاروی میکوئی سفید عربی به ترتیب کدام است؟

 - ۱) زئپلانکتون و مرحله لاروی ناپلیوس
 - ۲) فیتوپلانکتون و مرحله لاروی زوا

- ۱۳۸- در کارگاه تکثیر میگویی سفید غربی، روش مستقیم القای رسیدگی جنسی مولدین ماده میگو، کدام است؟

۴) زتوپلانتکتون و مرحله پست لاروی

۴) فیتوپلانتکتون و مرحله لاروی مایسیس

- (۱) قطع پایه چشمی مولدین
 - (۲) تغذیه مناسب مولدین

- (۳) مدیریت یهینه شرایط محیطی مخازن نگهداری مولдин
 (۴) کاربرد هورمون‌ها در القاء رسیدگی جنسی مولдин

- ۱۳۹- مهمنه ترین نقش پروستاگلاندین‌ها در تولید مثل میگو، کدام است؟^{۲)}

- ۴) بلوغ نهایی گناد و تخم مریزی
۴) عملکرد به عنوان فرمان جنسی

- ۱) یورونتیپ، ۲) کلیپ، ۳) بازدارنده پوست اندازی، ۴) افزاینده قند خون، ۵) متابولیسم کلسیم در میکوها، تحت تأثیر دام هورمون است.

- ۱۴۱- تنظیم متابولیسم و قند خون در سخت پوستان، توسط کدام اندام در بدن انجام می‌شود؟

- ۱۴۲- در مورد میگوها، گزینه صحیح کدام است؟^۴
- (۱) گردش خون بسته دارند.
 - (۲) دارای یک یا دو جفت غده سبز می‌باشند.
 - (۳) جذب غذا در بخش انتهایی روده انجام می‌شود.
 - (۴) غذاگیری از طریق چنگال‌های اول و دوم پاهای شنا صورت می‌گیرد.
- ۱۴۳- در پرورش میگوی وانامی به روش Biofloc، میزان پروتئین مصرفی جیره غذایی چند درصد است؟^۵
- | | | |
|----|----|----|
| ۱۵ | ۲۵ | ۳۰ |
| ۱۵ | ۲۵ | ۴۰ |
- ۱۴۴- با توجهی کی توزیخ تخم در «*Macrobrachium rosenbergii*» چه تغییری در تخم‌ها ایجاد می‌شود؟^۶
- (۱) تخم‌ها به راحتی از محفظه مادری قابل جدا شدن هستند.
 - (۲) چشم‌های لارو در تخم‌ها به راحتی قابل مشاهده است.
 - (۳) رنگ تخم‌ها از نارنجی به خاکستری تیره تغییر می‌یابد.
 - (۴) حرکت لارو در تخم‌ها قابل مشاهده می‌شود.
- ۱۴۵- برای ضدغوفونی دیواره‌های مخازن پرورش ماهی بهترین ماده مصرفی کدام است؟^۷
- | | | |
|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ |
| ۱ | ۲ | ۳ |
- ۱۴۶- در کدام مقیاس تولید مرکز تکثیر میگوهای دریایی، حجم کل مخازن $100 - 1000$ مترمکعب بوده و تولید سالانه آن حدود $20 - 20$ میلیون پست لارو است؟^۸
- | | | |
|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ |
| ۱ | ۲ | ۳ |
- ۱۴۷- در کدام مرحله رسیدگی جنسی مولد ماده میگوهای دریایی تجمع رنگدانه در تخمک‌ها بیشتر و تخمک به رنگ سبز تیره می‌شود و تخدمدان در بخش اولین و دومین بند شکمی به طور کامل متورم و از طرفین توسعه می‌یابد و قطر تخمک به حدود $2 - 3$ میلی‌متر و شاخص GSI به حدود $8 - 10$ درصد می‌رسد؟^۹
- | | | |
|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ |
| ۱ | ۲ | ۳ |
- ۱۴۸- در کدام روش تکثیر میگوهای دریایی تخم‌ریزی مولد، پرورش لاروی و پرورش غذای زنده همه در داخل یک مخزن انجام می‌شود؟^{۱۰}
- | | | |
|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ |
| ۱ | ۲ | ۳ |
- ۱۴۹- مهم‌ترین عامل عملکرد باکتری‌های هتروتروف در استخراهای میگو کدام گزینه است؟^{۱۱}
- | | | |
|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ |
| ۱ | ۲ | ۳ |
- ۱۵۰- پناسما در میگو چگونه به وجود می‌آید؟^{۱۲}
- | | | |
|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ |
| ۱ | ۲ | ۳ |

اصول تغذیه آبزیان:

- ۱۵۱- ارتباط متقابل مثبت در پرورش چند گونه‌ای ماهی‌ها از چه طریق بر اقتصادی بودن پرورش ماهی تأثیرگذار است؟^{۱۳}
- (۱) افزایش تولید در واحد حجم
 - (۲) بقاء و رشد بیشتر گونه‌های مقاوم
 - (۳) حذف گونه‌های ضعیفتر
 - (۴) فراهم کردن شرایط تغذیه‌ای بهتر برای گونه‌ها

- ۱۵۲ - علت تولید بیشتر انرژی بهوسیله چربی‌ها کدام است؟
 ۱) تعداد اتم‌های کربن و هیدروژن بیشتر در ساختمان آن‌ها
 ۲) وجود تعداد پیوند مضاعف بیشتر در ساختمان آن‌ها
 ۳) ورود آسان‌تر به چرخه کربس
 ۴) کاتابولیسم بهتر در آبزیان
- ۱۵۳ - کدام گروه از چربی‌ها در بدن جانوران، بیشتر نقش حفاظتی دارند؟
 ۱) تری گلیسریدها ۲) گلیکولیپیدها ۳) فسفولیپیدها ۴) مومنها
- ۱۵۴ - در متابولیسم انرژی در آبزیان، کدام یک از اشکال انرژی تحت تأثیر مدیریت پرورش قرار می‌گیرد؟
 ۱) نگهداری ۲) خام ۳) قابل متابولیسم ۴) قابل هضم
- ۱۵۵ - عملکرد ساختمانی پروتئین‌ها، بیشتر تحت تأثیر کدام عامل است?
 ۱) قابلیت هضم و جذب پروتئین‌ها
 ۲) ارزش بیولوژیک و ترکیب اسیدهای آمینه
 ۳) نوع و توالی خاص اسیدهای آمینه در رشته‌های پپتیدی
 ۴) توالی خاص اسیدهای آمینه و نحوه اتصال رشته‌های پپتیدی
- ۱۵۶ - برای تغذیه ماهی‌ها در یک مزرعه پرورش ماهی، چه نکاتی باید مدنظر قرار گیرد؟
 ۱) اندازه ماهی، تعداد، درصد غذا دهی و شرایط فیزیکی - شیمیایی آب
 ۲) تراکم کشت، نوع غذا، شرایط فیزیکی - شیمیایی آب و دفعات غذا دهی
 ۳) دمای آب، اندازه ماهی، مقدار غذای روزانه و میزان بازماندگی
 ۴) وزن ماهی، شرایط فیزیکی - شیمیایی آب، تراکم کشت و میزان بازماندگی
- ۱۵۷ - احتیاج جیره‌ای پروتئین، در کدام گروه از بچه ماهیان انگشت قد و در چند درجه سانتی‌گراد بیشتر است؟
 ۱) آمور - ۲۵ ۲) کپور - ۲۵ ۳) قزل‌آلا - ۱۸ ۴) قزل‌آلا - ۱۰
- ۱۵۸ - تجمع انبوه کدام یک از ریزمغذی‌ها در بدن ماهی‌ها بهتر صورت می‌گیرد؟
 ۱) اسیدهای چرب
 ۲) اسیدهای آمینه
 ۳) مواد معدنی
 ۴) ویتامین‌های محلول در آب
- ۱۵۹ - از دیدگاه مدیریت تغذیه ماهی، توجه به کدام یک از شرایط در یک مزرعه پرورش ماهی اهمیت بیشتری دارد؟
 ۱) غذا دهی در ساعات معین
 ۲) توزیع غذا براساس اشتها ماهی
 ۳) غذا دهی در میانه روز
 ۴) افزایش دائمی غذای روزانه
- ۱۶۰ - در تولید جیره‌های برانرژی، استفاده از کدام منبع انرژی، توصیه می‌شود؟
 ۱) اسیدهای چرب MUFA n3
 ۲) اسیدهای چرب MUFA
 ۳) فسفولیپیدها
 ۴) نشاسته ژلاتینه
- ۱۶۱ - در تولید خوراک آبزیان کدام افزودنی اهمیت بیشتری دارد؟
 ۱) محرک‌های رشد
 ۲) جلب کننده‌ها
 ۳) آنتی اکسیدان‌ها
 ۴) آنتی اکسیدان‌ها
- ۱۶۲ - ترتیب تأثیر آنزیم‌های هضم کننده پروتئین در دستگاه گوارش ماهیان گوشت‌خوار، چگونه است?
 ۱) اسید معده، کموتریپسین، آمینو پپتیداز، دی پپتیداز و پپسین
 ۲) پپسین، تریپسین، کموتریپسین، کربوکسی پپتیداز و دی پپتیداز
 ۳) پپسین، دی پپتیداز، کربوکسی پپتیداز و آمینو پپتیداز
 ۴) تریپسین، کموتریپسین، کربوکسی پپتیداز، پپسین و دی پپتیداز

- ۱۶۳ - کدام گروه، در برابر اکسید شدن مقاوم‌تر هستند؟
 ۱) چربی‌های مرکب ۲) چربی‌های حقیقی ۳) لیپوپروتئین‌ها
 ۴) واکس‌ها
- ۱۶۴ - در تغذیه آبزیان کدام گروه از کربوهیدرات‌ها اهمیت بیشتری دارند؟
 ۱) الیگو ساکاریدها ۲) پلی ساکاریدها ۳) دی ساکاریدها
 ۴) مونو ساکاریدها
- ۱۶۵ - جایگزینی آرد ماهی با منابع پروتئین گیاهی در جیره، منجر به عدم دسترسی به کدام مواد می‌شود؟
 ۱) مس و منگنز ۲) روی و آهن ۳) فسفر و روی ۴) کلسیم و فسفر
- ۱۶۶ - برای فرموله کردن جیره غذایی آبزیان، کدام عامل اهمیت بیشتری دارد؟
 ۱) احتیاجات غذایی گونه مورد نظر ۲) رفتار تغذیه‌ای گونه مورد نظر
 ۳) دسترسی به مواد غذایی ۴) قابلیت هضم و جذب ماده غذایی
- ۱۶۷ - گزینه صحیح در مورد اجزای ثابت جیره غذایی کدام است؟
 ۱) اجزای ثابت جیره فاقد هر نوع ماده مغذی است.
 ۲) پروتئین موجود در اجزای ثابت جیره، نقشی در تنظیم اجزای متغیر ندارد.
 ۳) آنتی‌بیوتیک‌ها از اجزای ثابت هستند که استفاده از آن‌ها در تمام جیره‌ها ضروری است.
 ۴) با افزایش مقدار اجزای ثابت جیره، باید میزان مواد مغذی در اجزای متغیر جیره افزایش یابد.
- ۱۶۸ - کدام قند در ترکیب ساختمانی پورین‌ها و نوکلئوزیدها شرکت دارد؟
 ۱) ریبوز ۲) رافینوز ۳) گلوکز ۴) گالاكتوز
- ۱۶۹ - در تغذیه عملی ماهی‌ها در مزارع پرورش، به کدام پارامتر باید بیشتر توجه کرد؟
 ۱) ارزی جیره ۲) اندازه ماهی ۳) دفعات غذا دهی ۴) دورت آب
- ۱۷۰ - کاهش مقاومت در برابر بیماری‌ها، ناشی از کمبود کدام عامل در غذای آبزیان است؟
 ۱) اسیدهای چرب ۲) آمینواسیدهای ضروری
 ۳) مواد معدنی و ویتامین‌ها ۴) فسفولیپیدها

هیدروبیولوژی عمومی:

- ۱۷۱ - کمترین تعداد حلقه‌های زنجیره غذایی در آب‌ها، مربوط به کدام اکوسیستم است؟
 ۱) اقیانوس‌ها ۲) مصب‌ها ۳) مناطق فراچاهنده
 ۴) مناطق ساحلی
- ۱۷۲ - کدام گروه از جلبک‌ها به «Prokaryotes» تعلق دارند؟
Rhodo phycea (۲) *Baeillary phycea* (۱)
Cyano phycea (۴) *Chryso phycea* (۳)
- ۱۷۳ - کدام گروه از چشمه‌ها، کمترین میزان دبی آب را دارند؟
Rhitral (۴) *Limnocrem* (۳) *Holocrem* (۲) *Crenal* (۱)
- ۱۷۴ - کدام دسته از ماکروفیت‌های رودخانه‌ای، دیرتر وارد چرخه مواد می‌شوند؟
Floating leaved plants (۲) *Emergent plants* (۱)
Submerged plants (۴) *Marginal plants* (۳)
- ۱۷۵ - رنگ آب معمولاً در مخازن آب‌های ماورای سور (هیپر‌هالین)، کدام است؟
 ۱) آبی ۲) سفید ۳) سبز
 ۴) قرمز

- ۱۷۶- قوانین آن و برگمن، بیانگر کدام سازگاری موجودات در مقابل دمای هاد هستند؟
 ۱) اکولوژیکی ۲) رفتاری ۳) فیزیولوژیکی ۴) مورفولوژیکی
- ۱۷۷- اندازه موجودات اولین حلقه زنجیره غذایی و طول زنجیره غذایی چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟
 ۱) رابطه عکس دارند. ۲) رابطه مستقیم دارند.
 ۳) رابطه یکسانی دارند. ۴) ارتباطی با یکدیگر ندارند.
- ۱۷۸- «Tubifex و Ephemeroptera»، به ترتیب شاخص کدام آب‌ها هستند؟
 ۱) آلفا مزوساپروب - الیگوساپروب ۲) باتامزوساپروب
 ۳) الیگوساپروب - باتامزوساپروب ۴) پلیساپروب
- ۱۷۹- کدام شرایط سبب تشدید عمل تثبیت ازت در جلبک‌های سبز - آبی می‌شود؟
 ۱) دمای پایین ۲) کمبود فسفر
 ۳) وجود مقادیر بالای آهن و فسفر ۴) وجود مقادیر بالای دی‌اکسید کربن
- ۱۸۰- مقادیر بالای مواد هویمیکی همراه با حاصل خیزی پایین، ویژگی کدام آب است؟
 ۱) الیگوتروف ۲) میوتروف ۳) دیستروف ۴) یوتروف
- ۱۸۱- کدام گروه، جمعیت غالب جامعه فیتوپلانکتونی و رئوپلانکتونی را در آب‌های با pH پایین تشکیل می‌دهد؟
 ۱) داینوفلازلهای - دافنی‌ها ۲) داینوفلازلهای - پاروپایان
 ۳) دیاتومهای - پاروپایان ۴) دیاتومهای - دافنی‌ها
- ۱۸۲- مشاهده نسبت‌های جنسی متفاوت در جمعیت‌های بی‌مهرگان آبزی تحت تأثیر کدام عامل است؟
 ۱) دما ۲) شدت تابش ۳) شدت چرا ۴) وفور غذا
- ۱۸۳- افزایش تولید در لایه سطحی آب‌های ساکن، تحت تأثیر کدام عامل است؟
 ۱) افزایش چگالی ۲) تلاطم ۳) جریان‌های چرخشی ۴) فصول سال
- ۱۸۴- تولید کنندگان، ارگانیسم‌هایی هستند که قادرند با استفاده از مواد مغذی و به همراه کدام مورد غذاسازی کنند؟
 ۱) انرژی نوری ۲) انرژی نوری و عمل فتوسنتر ۳) انرژی نوری و از فرایندهای شیمیایی ۴) انرژی نوری و از فرایندهای شیمیایی
- ۱۸۵- کدام راسته‌ها در مرحله پورگی در آب به سر نمی‌برند؟
 ۱) یک روزه‌ها ۲) نیم بالان ۳) طیاره مانندها ۴) بهاره‌ها
- ۱۸۶- کدام گروه از گیاهان آبزی، کلیه نیازهای خود را از محیط آبی دریافت می‌کنند؟
 Submerged plants (۲) Emergent plants (۱)
 Floating leaved plants (۴) Marginal plants (۳)
- ۱۸۷- تغییر شکل ظاهری دافنی‌ها در محیط طبیعی، در چه فصلی دیده می‌شود؟
 ۱) بهار ۲) تابستان ۳) پاییز ۴) زمستان
- ۱۸۸- در نقشه‌های کلاسه کیفی آب‌ها، منطقه فاقد حیات کدام است؟
 ۱) اولتراساپروب ۲) اولیگوساپروب ۳) متاساپروب ۴) هیبرساپروب
- ۱۸۹- نمونه‌بردار مناسب برای نمونه‌برداری از کفرزیان در رودخانه‌های کم عمق، کدام است؟
 Core (۴) Dredge (۳) Grab (۲) Surber (۱)
- ۱۹۰- کدام گزینه در مورد چشمه‌های سقوطی «Rheocren» درست است؟
 ۱) اکسیژن‌گیری مناسب‌تری دارند. ۲) تبادل حرارتی زیادی با محیط خود دارند.
 ۳) گیاه فراوان در پست آن‌ها رشد می‌نماید. ۴) میزان رسوب در پست آن‌ها زیاد می‌باشد.

پویایی جمعیت و ارزیابی ذخایر آبزیان:

- ۱۹۱- مهم‌ترین کاربرد پیشینه پردازی در برآورد پارامترهای پویایی جمعیت آبزیان، کدام است؟

- (۱) تعیین طول همه کلاسه‌های سنی
- (۲) تعیین حدود اطمینان و واریانس کلاسه‌های سنی
- (۳) تعیین سن کلاسه‌های طولی قوی
- (۴) کنترل صحت تعیین سن کلاسه‌های طولی

- ۱۹۲- اگر معادله رشد فان بر تالانفی یک جمعیت ماهی $L_t = 50 \cdot \exp(-0.16(t+0.5))$ باشد، سن صفر (t_0) این جمعیت چند ماه است؟

$$t_0 = -\frac{\ln(0.5)}{0.16} = -\frac{\ln(0.5)}{0.16} = -\frac{\ln(0.5)}{0.16} = -\frac{\ln(0.5)}{0.16}$$

- ۱۹۳- در روش باتاچاریا (Bhattacharya)، با چه نوع داده‌ای کوهروت‌ها را از هم تمییز می‌دهند؟

- (۱) سن ماهی
- (۲) طول ماهی
- (۳) مرگ‌ومیر ماهی
- (۴) وزن ماهی

- ۱۹۴- عامل تعیین‌کننده مرگ‌ومیر طبیعی در فرمول ریختر و افانوف (Rikhter and Efanov)، کدام است؟

$$T_m = 50 \cdot \left(\frac{L_m}{L_\infty} \right)^{0.16}$$

- ۱۹۵- هدف نهایی علم ارزیابی ذخایر آبزیان، کدام است؟

- (۱) تعیین نرخ بهینه بهره‌برداری
- (۲) محاسبه رشد و مرگ‌ومیر افراد ذخیره
- (۳) محاسبه سایز چشمۀ مناسب در تور صیادی

- ۱۹۶- رویکرد محتاطانه در مدیریت صیادی بر کدام پایه استوار است؟

- (۱) پویایی جمعیت ذخایر
- (۲) حدود ایمن زیستی
- (۳) ساختار طولی ذخایر
- (۴) سناریوی برداشت کوتاه‌مدت

- ۱۹۷- ساده‌ترین رابطه بین صید به ازای واحد تلاش، در کدام مدل وجود دارد؟

$$Y = \text{کلرن} \cdot \text{شیفر} \quad (1)$$

- ۱۹۸- در مساحت ۲۵۰ مترمربع از رودخانه‌ای در یک صید ۲۴ و در صید بعدی ۱۵ عدد سگ ماهی صید شده است، برآورد جمعیت سگ ماهی در یک هکتار کدام است؟

$$N = \frac{24 \cdot 15}{24 + 15} = 15.6 \quad (2)$$

- ۱۹۹- در تعیین نرخ رشد با استفاده از نمودار (رگرسیون خطی) گولاند و هولت، $L_t = 5400 + 2560t$ در کدام قسمت نمودار، قرار دارد؟

- (۱) محل تلاقی خط رگرسیون با محور X
- (۲) محل تلاقی خط رگرسیون با محور Y
- (۳) عرض از مبدأ رگرسیون

- ۲۰۰- براساس روش ارزیابی پترسن، پس از نشان دار کردن ۱۵۰۰ ماهی در دریاچه‌ای، صید مجدد انجام و در آن ۷۲۰ ماهی صید شدند که ۱۵۰ ماهی نشان دار بودند. کل جمعیت چقدر تخمین‌زده می‌شود؟

$$N = \frac{1500 \cdot 7200}{1500 + 7200} = 9300 \quad (3)$$

- ۲۰۱- ماهیانی که در سال ۱۳۸۹ متولد و در سال ۱۳۹۶ صید شده‌اند، چگونه معرفی می‌شوند؟

$$N = \frac{1396^7 - 1389^7}{1396^7 - 1389^7} = 12^+ \quad (4)$$

- ۲۰۲- در ردیابی حلقه‌های رشد روی مهره کوسه‌ها، از کدام ماده استفاده می‌شود؟

- (۱) آلیزارین
- (۲) اسید فوژین
- (۳) رزین
- (۴) هیدروواکسید سدیم

- ۲۰۳- گونه‌های کوتاه عمر به کدام منحنی فراخوان شبیه هستند؟

$$Y = \frac{1}{1 + e^{-k(X - X_0)}} \quad (5)$$

- ۲۰۴- کدام مدل، در دسته مدل‌های پیش‌بینی کننده قرار دارد؟

$$N = \frac{1}{1 + e^{-k(X - X_0)}} \quad (6)$$

- ۲۰۵- ماتریس داده‌های مربوط به روش جالی (Jolley) در ۶ بار صید در جدول زیر داده شده است. مقدار Z کدام است؟

دفعات صید	n_i	S_i	۱	۲	۳	۴	۵
۱	۷۳	۷۳			—		
۲	۹۹	۹۷		۱۳			
۳	۱۴۱	۱۳۸	۷	۲۱			
۴	۱۶۷	۱۶۲	۲	۱۱	۳۴		
۵	۱۰۷	۱۰۱	۰	۳	۰	۲۷	
۶	۱۵۶	۱۵۰	۱	۱	۷	۱	۱۳

(۱) ۶ (۲) ۱۲ (۳) ۲۸ (۴) ۴۷

- ۲۰۶- اگر سن نمونه‌ای از فیل ماهی در زمان صید در سال ۱۳۹۸، ۱۵ سال تعیین شده باشد، "Year class" کدام است؟

(۱) ۱۳۸۲ (۲) ۱۳۸۳ (۳) ۱۳۸۴ (۴) ۱۳۸۵

- ۲۰۷- کدام مدل ارزیابی ذخایر، دارای ساختار طولی یا سنی هستند؟

(۱) هولیستیک (۲) مساحت جاروب شده (۳) پویایی زی توده (۴) آنالیزی یا تحلیلی

- ۲۰۸- کدام مورد، از مشکلات اساسی نمونه‌برداری تصادفی در مطالعات ارزیابی ذخایر آبزیان محسوب می‌شود؟

(۱) انتخاب بدیری ادوات صید (۲) در معرض خطر بودن یا انقراض ذخیره

(۳) نیروی انسانی ناکافی (۴) هزینه بالای نمونه‌برداری

- ۲۰۹- خروجی‌های اصلی روش محاسباتی پاول - وترال شامل کدام موارد هستند؟

(۱) F و I_{∞} (۲) K و M (۳) K و٪ (۴) I_{∞} و I_0

- ۲۱۰- در روش هانیک، برای تعیین مرگ‌ومیر کل، از کدام پارامترها به عنوان ورودی اصلی استفاده می‌شود؟

(۱) CPUE و CPUA (۲) طول و سن

(۳) سن و CPUA (۴) CPUE

شیمی فرآورده‌های شیلاتی:

- ۲۱۱- در مورد ترکیب تری‌متیل آمین اکساید (TMAO) در محصولات شیلاتی، گزینه نادرست کدام است؟

(۱) در عضلات تمامی ماهیان آب شور وجود دارد.

(۲) مقدار این ماده در ماهیان آب شیرین کم و ناچیز است.

(۳) در اثر فعالیت آنزیم تری‌متیل آمین اکساید رداکتاز بر روی TMA، تولید می‌شود.

(۴) سبز شدن رنگ گوشت ماهی تن در فرایند بخت اولیه با وجود این ماده در عضله ماهی مرتبط است.

- ۲۱۲- عامل ایجاد طعم تلخ در عضلات تیره ماهیان، کدام است؟

(۱) تجزیه پروتئین‌ها (۲) تجمع هیپوگزانتین

(۳) تجمع اینوزین منوفسفات (۴) حضور مقداری زیاد میوگلوبین

- ۲۱۳- ظرفیت نگهداری آب، با عملکرد کدام دسته از پروتئین‌های بافت ماهی مرتبط است؟

(۱) بافت پیوندی (۲) سارکوپلاسم (۳) میوژن (۴) میوفیبریل

- ۲۱۴ - اتویز کدام گزینه، سبب تکه شدن فیله ماهی می‌شود؟
- (۱) آکتین
 - (۲) تروپوین
 - (۳) میوزین
 - (۴) میوکوماتا
- ۲۱۵ - کدام غشاء، رشته‌های عضلانی ماهی را در بر می‌گیرد؟
- (۱) سادکومر
 - (۲) میوتوم
 - (۳) میوکوماتا
 - (۴) میومر
- ۲۱۶ - در محصولات شیلاتی خشک شده (با فعالیت آبی کم)، اکسایش لیپیدها به دلیل کدام است؟
- (۱) بروز واکنش قهقهه‌ای شدن میلارد
 - (۲) تأثیر آنزیم‌های هیدرولیز کننده لیپید
 - (۳) عملکرد رادیکال‌های آزاد
 - (۴) محدودیت در دسترسی به یون‌های فلزی
- ۲۱۷ - کدام ویژگی عملکردی پروتئین‌ها، در محصولاتی نظیر سوریمی، کاربرد بیشتری دارد؟
- (۱) امولسیون کنندگی
 - (۲) تشکیل ژل
 - (۳) تولید کف
 - (۴) حلالیت
- ۲۱۸ - کدام ترکیب جزو آنتی‌اکسیدان‌های طبیعی درون سلولی در بافت ماهی نیست؟
- (۱) آنسرین
 - (۲) اسید آسکوربیک
 - (۳) پروپیل گالات
 - (۴) توکوفرول
- ۲۱۹ - کدام مورد درباره فسفولیپیدهای بافت ماهی پرچرب صحیح است؟
- (۱) جزو دسته لیپیدهای ذخیره‌ای هستند.
 - (۲) به عنوان منبع انرژی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
 - (۳) بخش عمده لیپید عضلات ماهی را تشکیل می‌دهند.
 - (۴) مقدارشان در عضلات تیره بیشتر از عضلات روشن است.
- ۲۲۰ - کاهش و افزایش pH پس از مرگ، به کدام عوامل بستگی دارد؟
- (۱) شکسته شدن نوکلئوتیدها - تشدید فعالیت‌های اکسیداسیونی
 - (۲) شکسته شدن ناقص گلیکوزن به اسید لاکتیک - افزایش فعالیت میکروب‌ها
 - (۳) افزایش فعالیت میکروب‌ها - شکسته شدن ناقص گلیکوزن به اسید لاکتیک
 - (۴) افزایش فعالیت میکروب‌ها - شکسته شدن نوکلئوتیدها
- ۲۲۱ - از منظر شدت بروز اکسیداسیون چربی، به کدام دلیل عضلات تیره ماهی از استعداد بالاتری در مقایسه با عضلات روشن (سفید) برخوردار هستند؟
- (۱) ترکیب ویتامین‌ها و ترکیبات ازته غیر پروتئینه موجود در عضلات تیره
 - (۲) کمتر بودن سهم آنتی‌اکسیدان‌های طبیعی در عضلات تیره
 - (۳) بالاتر بودن مقدار آهن هم در عضلات تیره
 - (۴) وجود عروق خونی کمتر در عضلات تیره
- ۲۲۲ - کدام گزینه در مورد pH ایزووالکتریک نادرست است؟
- (۱) پروتئین‌ها از نظر بار الکتریکی خنثی هستند.
 - (۲) پروتئین‌ها کمتر از حالت یونیزه، آب دوست هستند.
 - (۳) حلالیت پروتئین به کمترین مقدار خود می‌رسد.
 - (۴) ظرفیت اتصال آب پروتئین در بیشترین مقدار خود است.
- ۲۲۳ - کدام مورد در ماهیان سبب تجمع فراورده‌های حاصل از شکستن ATP می‌شود؟
- (۱) اکسیداسیون پروتئین
 - (۲) تأثیر نور و اکسیژن محیط
 - (۳) تغییرات اتوکتیک
 - (۴) هیدرولیز لیپیدها
- ۲۲۴ - کدام دسته از پروتئین‌ها، طی فرایند تولید سوریمی به منظور دستیابی به بافت مناسب به وسیله شستشو حذف می‌شوند؟
- (۱) استرومما
 - (۲) تروپومیوزین‌ها
 - (۳) سارکوپلاسمیک
 - (۴) میوفیبریلار

- ۲۲۵ - رنگ گوشت ماهی به دلیل وجود کدام پروتئین‌ها است؟
- (۱) الاستین و تروپونین
 - (۲) تروپومیوزین و آکتین
 - (۳) میوزین و هموگلوبین
 - (۴) میوگلوبین و هموگلوبین
- ۲۲۶ - پروتئین‌های حل شونده در محلول‌های غلیظ نمکی و دارای نقش در نگهداری آب در ماهیان، کدام است؟
- (۱) استرومای هم
 - (۲) ساختاری
 - (۳) سارکوپلاسمیک
 - (۴) میوژن
- ۲۲۷ - کدام ترکیب، در عضلات روشن ماهیان، بیشتر از عضلات تیره آن‌ها است؟
- (۱) رنگدانه‌های هم
 - (۲) سارکوپلاسمیک رتیکولوم
 - (۳) میتوکندری
 - (۴) میوتومیوزین
- ۲۲۸ - ستون فقرات فیلامنت‌های نازک در سارکومر را کدام پروتئین تشکیل می‌دهد؟
- (۱) آکتین
 - (۲) تروپونین
 - (۳) اکتومیوزین
 - (۴) میوزین
- ۲۲۹ - در طی فرایند تبدیل هیستیدین به هیستامین در عضله ماهی، کدام فرایند اتفاق می‌افتد؟
- (۱) آمین‌زادایی از هیستیدین
 - (۲) استیل‌زادایی از هیستیدین
 - (۳) کربوکسیل‌زادایی از هیستیدین
 - (۴) هیدروکسیل‌زادایی از هیستیدین
- ۲۳۰ - در ماهیان صید شده از دریا، منشأ بوی ماهی (**Fishy odor**) را به وجود کدام ترکیب در آن نسبت می‌دهند؟
- TVA-N (۴) TVB-N (۳) TBA (۲) TMA (۱)

اصول فرآوری محصولات شیلاتی:

- ۲۳۱ - کدام آنزیم‌ها، بر روی پروتئین میوزین تأثیر گذاشته و سبب ضعیف شدن ژل سوریمی می‌شود؟
- (۱) ATP_{ase}
 - (۲) ترانس گلوتامینازها
 - (۳) فسفولیپازها و لیپازها
 - (۴) کاپتیسین L و پروتئازهای قلیایی
- ۲۳۲ - کدام فرایند جهت جلوگیری از دفع آب محصول در داخل قوطی کنسرو (که سبب رقیق شدن سس و ایجاد ظاهر نامناسب و نامطلوب در کنسرو می‌گردد) انجام می‌شود؟
- (۱) هواگیری
 - (۲) پخت اولیه
 - (۳) آب نمک‌گذاری
 - (۴) اتوکلاو کردن
- ۲۳۳ - افزایش pH محتویات قوطی کنسرو ماهی، در طی انبار کردن ماهی نشانه کدام است؟
- (۱) افزودن بیش از حد نمک و روغن قبل از درب بندی
 - (۲) برهم خوردن تعادل غلظت مواد معدنی
 - (۳) تشدید اکسیداسیون چربی
 - (۴) فعالیت میکروبی
- ۲۳۴ - شکل‌گیری کربیستال‌های شبیه خردشیشه در کنسرو ماهی (تن) نشانه آلودگی نمک به کدام مورد است؟
- (۱) بیدید پتاسیم
 - (۲) سولفات مس
 - (۳) سولفید سدیم
 - (۴) کلرور منیزیم
- ۲۳۵ - در کدام مورد، شاهد دناتوره شدن (واسرستی) پروتئین محصول، در مرحله دودی کردن ماهی هستیم؟
- (۱) دودی گرم
 - (۲) دودی سرد
 - (۳) تزریق دود مایع به گوشت ماهی
 - (۴) فروبردن محصول آب نمک‌گذاری شده در محلول دود
- ۲۳۶ - رنگ فراورده‌های دودی، حاصل کدام ترکیب موجود در دود است؟
- ۴) هیدروکربن ۳) کربونیل ۲) فنل ۱) الکل

- ۲۳۷- در روش‌های مرسوم دودی کردن (دودی گرم و دودی سرد) از چه روش‌های نگهداری، برای محافظت از محصول استفاده می‌شود؟ (به ترتیب از راست به چپ)

- (۱) شیمیایی - فیزیکی - شیمیایی
- (۲) شیمیایی - فیزیکی - شیمیایی
- (۳) فیزیکی - شیمیایی - فیزیکی - شیمیایی

- ۲۳۸- در خلال فرایند انجماد، حالت فوق اشباع ترکیبات محلول در آب و فوق سرما در کدام مراحل سه‌گانه انجماد اتفاق می‌افتد؟ (به ترتیب از راست به چپ)

- (۱) اول - دوم
- (۲) اول - سوم
- (۳) سوم - اول
- (۴) دوم - دوم

- ۲۳۹- در مورد واسرشتی (دناتوره شدن) پروتئین مخصوصات شیلاتی در خلال انجماد، کدام مورد نادرست است؟

(۱) انجماد تأثیر قابل ملاحظه‌ای در کاهش ظرفیت نگهداری آب در سیستم عضلانی به‌واسطه دناטורه شدن پروتئین دارد.

(۲) جایگزینی واکنش‌های متقابل (پروتئین - پروتئین) با واکنش‌های (آب - پروتئین)، سبب دناטורه شدن پروتئین و تشکیل تراکم یا انباشتگی پروتئینی می‌شود.

(۳) عوامل اکسیداسیونی (پروتئین و فلزات) می‌توانند با پروتئین واکنش داده و در دناטורه شدن پروتئین دخالت نمایند.

(۴) قرار گرفتن پروتئین‌ها در غلظت زیاد نمک در فاز غیرمنجمد، سبب تغییر ساختار ذاتی پروتئین می‌شود.

- ۲۴۰- سرعت نمک سود کردن، در کدام روش بیشتر است؟

- (۱) تزریقی
- (۲) تحت فشار
- (۳) خشک
- (۴) مرطوب

- ۲۴۱- در فراورده‌های شیلاتی نمک سود شده، نمک چگونه باعث کاهش سرعت رشد باکتری‌های محیط می‌شود؟

- (۱) اختلال در تنظیم سیستم اسمزی میکروب‌ها
- (۲) تشدید تولید ترکیبات ضد باکتریایی
- (۳) تغییر در pH مطلوب برای فعالیت میکروب‌ها
- (۴) ممانعت از رسیدن اکسیژن به باکتری

- ۲۴۲- در کدام آبزی، قسمت خوراکی بدن علاوه بر گوشت موجود در ناحیه شکمی و دمی، در داخل چنگال‌ها و پاهای نیز وجود دارد؟

- (۱) اویستر
- (۲) لابستر
- (۳) صدف دوکفه‌ای
- (۴) میگو

- ۲۴۳- حجم گوشت قابل استحصال، در کدام ماهیان کمتر است؟

- (۱) با سر بزرگ
- (۲) بیضی شکل
- (۳) پهنهن
- (۴) دوکی شکل

- ۲۴۴- کدام عامل تأثیری بر سرعت جذب نمک، طی نمک سود کردن ماهی ندارد؟

- (۱) دمای محیط
- (۲) غلظت نمک
- (۳) میزان چربی
- (۴) نور محیط

- ۲۴۵- علت اصلی کاهش وزن ماهیان منجمد در طی دوره نگهداری در سردخانه، کدام است؟

- (۱) وجود نور و اکسیژن زیاد در فضای سردخانه
- (۲) پایین بودن بیش از حد رطوبت در محیط سردخانه
- (۳) چیدمان نامناسب ماهیان منجمد در قفسه‌های سردخانه
- (۴) نگهداری گونه‌های مختلف ماهی منجمد شده به‌طور همزمان در سردخانه

میکروبیولوژی فرآورده‌های شیلاتی:

- ۲۴۶- کدام باکتری‌ها منشأ عفونی دارند و برای مصرف کننده خطرناک هستند؟

- (۱) سالمونلا - ویبریو - سودوموناس - آنتروموناس
- (۲) سالمونلا - شیگلا - کلی فرم - آنتروکوک
- (۳) کلی فرم - آنتروکوک - سودوموناس - ویبریو
- (۴) موراکسلا - شیگلا - کلی فرم - ویبریو

- ۲۴۷- مصرف ماهیان صید شده از مناطقی که پستانداران دریابی زیادی وجود دارند، احتمال آلودگی کدام مورد را افزایش می‌دهد؟
- (۱) آنیزاكیس سیمپلکس
 (۲) کلونورکیس سیننسیس
 (۳) گناتوستوما هپسیدوم
- ۲۴۸- در فساد ماهیان صید شده از مناطق معتدل وقتی در سرما نگهداری می‌شوند، کدام مورد نقش دارد؟
- (۱) *Anterobacteriaceae*
 (۲) *Photobacter*
 (۳) *Shewanella*
- ۲۴۹- در کدام روش عمل آوری، بار میکروبی موجود در ماهی کمتر از بین می‌رود؟
- (۱) خشک کردن
 (۲) دودی کردن
 (۳) نمک سود کردن
- ۲۵۰- کدام مورد در طی فرایند نگهداری مواد غذایی موجب آلودگی می‌شود؟
- (۱) استافیلوکوکوس
 (۲) آتروموناس
 (۳) لیستریا
 (۴) فتوباتکریوم
- ۲۵۱- کدام باکتری میکروفلور جزو باکتری‌های پاتوژن احتمالی محسوب می‌شود؟
- (۱) *Vibrio* spp.
 (۲) *Shewanella* spp.
 (۳) *Pseudomonas* spp.
 (۴) *Aeromonas* spp.
- ۲۵۲- کدام میکرووارگانیسم در محصولات شیلاتی خشک شده بیشتر از سایرین در نزول کیفیت دخالت دارد؟
- (۱) مخمرها
 (۲) کپک‌ها
 (۳) باکتری‌های گرم منفی
- ۲۵۳- کدام عامل، موجب افزایش «lag phase» در رشد میکرووارگانیسم‌ها می‌شود؟
- (۱) افزایش شوری
 (۲) افزایش دما
 (۳) کاهش شوری
 (۴) کاهش دما
- ۲۵۴- نتیجه اکسیداسیون اسیدهای چرب غیراشعاع توسط میکرووارگانیسم‌ها، کدام است؟
- (۱) *TMA*
 (۲) *TVBN*
 (۳) *Lactate*
 (۴) *Aldehyde*
- ۲۵۵- کدام آمینو اسید، پیش‌ساز آمین بیوژن «کاراورین» است؟
- (۱) آرژنین
 (۲) لیزین
 (۳) تیروزین
 (۴) هیستیدین
- ۲۵۶- کدام متابولیت میکروبی، در ارتباط با کیفیت نامطلوب محصولات شیلاتی نیست؟
- (۱) دی‌استیل
 (۲) هیستامین
 (۳) تری‌متیل آمین
 (۴) ازت فرار
- ۲۵۷- مصرف نرم‌تنان دوکفه‌ای خام، منجر به مسمومیت با کدام میکرووارگانیسم پاتوژن می‌شود؟
- (۱) باسیلوس سابتیلیس
 (۲) لیستریا منوستیوژنز
 (۳) ویبریو پاراهمولیکوس
 (۴) یریستیا انتروكولیتیک
- ۲۵۸- کدام دسته از آنزیمهای باکتریابی در احیای **TMAO** به **TMA** نقش دارد؟
- (۱) آمینولیتیک
 (۲) لیپولیتیک
 (۳) پروتونولیتیک
 (۴) هیدرولیتیک
- ۲۵۹- مقادیر حداقل فعالیت آب برای رشد، در کدام میکرووارگانیسم کمتر است؟
- (۱) مخمرها
 (۲) مخمرهای اسموفیل
 (۳) کپک‌های خشکی دوست
 (۴) باکتری‌های هالوفیل
- ۲۶۰- سودوموناس و آتروموناس عامل اصلی فساد در چه دامنه دمایی بر حسب درجه سانتی‌گراد هستند؟
- (۱) ۲۰-۲۵
 (۲) ۱۵-۲۰
 (۳) ۱۰-۱۵
 (۴) ۰-۵

- ۲۶۱ - میدان الکتریکی چه تأثیری بر میکروارگانیسم‌ها دارد؟
- (۱) سبب تغییر در ساختار غشاء می‌شود.
 - (۲) سبب تورژسانس می‌شود.
 - (۳) سبب تشکیل روزنه در دیواره سلولی می‌شود.
 - (۴) سبب پلاسمولیز می‌شود.
- ۲۶۲ - کدام مورد، در اثر متابولیسم بی‌هوایی میکروارگانیسم‌ها تولید می‌شود؟
- (۱) آسید استیک
 - (۲) TVN
 - (۳) آمونیاک
 - (۴) TMAO
- ۲۶۳ - باکتری‌های عامل فساد سرمادوست به چه شرایطی نیاز دارند؟
- (۱) افزایش pH و افزایش ملایم شوری
 - (۲) افزایش pH و مقادیر کم کربوهیدرات
 - (۳) کاهش pH و افزایش کربوهیدرات
 - (۴) کاهش pH و افزایش پروتئین
- ۲۶۴ - کدام باکتری فلور طبیعی در ماهیان صید شده در آب‌های معتمد است؟
- (۱) باسیلیوس
 - (۲) سودوموناس
 - (۳) میکروکوک
 - (۴) کورینه فرم
- ۲۶۵ - کدام جنس از باکتری در تمام ماهیان آب شیرین وجود دارد، و به ندرت در ماهیان آب شور جدا شده است؟
- (۱) Streptococcus
 - (۲) Aeromonas
 - (۳) Bacillus
 - (۴) Micrococcus

اصول روش‌های صید آبزیان:

- ۲۶۶ - جدار محافظ (cover net) در ساختمان کدامیک از ادوات صید وجود دارد؟
- (۱) تور پره‌ساحلی
 - (۲) تور گوشگیر
 - (۳) تور سه‌جداره
 - (۴) تور فانوسی
- ۲۶۷ - در دریای عمان، از رشته قلاب‌های طویل جهت صید کدام گروه از ماهیان استفاده می‌شود؟
- (۱) تاس ماهیان
 - (۲) تون ماهیان
 - (۳) شگ ماهیان
 - (۴) ساردن ماهیان
- ۲۶۸ - کدامیک از تله‌های ثابت ماهی‌گیری (Set nets) آبزیان از نظر پایداری دارای کمترین مقاومت در مقابل شدت جریان آب هستند؟
- (۱) تله با یک کیسه مستقیم
 - (۲) تله با دو کیسه جانبی
 - (۳) تله با یک کیسه جانبی
 - (۴) تله با دو کیسه مشترک
- ۲۶۹ - از بین ادوات صید، کدامیک اثر مخرب بیشتری دارد؟
- (۱) Dredge net
 - (۲) Long line
 - (۳) Set net
 - (۴) Purse seine
- ۲۷۰ - وظیفه طناب‌های زوجی مهاری (Bridle) در ساختمان تورهای پیاله‌ای کدام است؟
- (۱) اتصال حلقه‌های فلزی به طناب وزنه
 - (۲) اتصال طناب فوقانی و تحتانی به یکدیگر
 - (۳) تزدیک کردن دو سر تور به هم
- ۲۷۱ - در روش صید مشتا، ماهی با کدام مکانیزم به دام می‌افتد؟
- (۱) به قلاب گرفتار شدن
 - (۲) جذب شدن
 - (۳) گوشگیر شدن
 - (۴) هدایت شدن
- ۲۷۲ - کدام روش در دریای خزر برای صید آبزیان مورد استفاده قرار می‌گیرد؟
- (۱) تور مخروطی بالارو
 - (۲) تور ترال
 - (۳) گرگور
 - (۴) مشتا
- ۲۷۳ - وینچ قدرتی «Power block» در کدام روش صید، مورد استفاده قرار می‌گیرد؟
- (۱) ترال
 - (۲) لانگ لاین
 - (۳) پرساین
 - (۴) ستنت

- در صید پرساین، از کدام الیاف مصنوعی استفاده می‌شود؟
 ۱) پلی استر ۲) پلی اتیلن ۳) پلی پروپیلن
 ۴) پلی وینیل دین کلراید
- با کدام وسیله برای چشمۀ تور، اندازۀ دقیق‌تری حاصل می‌شود؟
 ۱) Ruler (۱) ۲) Ices (۳) ۳) Wedge gauge (۲)
 Omega (۶)
- رابطه سیستم نمره‌بندی دنبر و تکس چگونه است؟

$$\text{Tex} = \frac{1}{9000} \times \text{Denier}$$
 (۲)
$$\text{Tex} = \frac{1}{111} \times \text{Denier}$$
 (۱)
- $$\text{Tex} = \frac{1}{1000} \times \text{Denier}$$
 (۴)
$$\text{Tex} = 111 \times \text{Denier}$$
 (۳)
- در ساخت ادوات صیادی، کدام گروه از الیاف مصنوعی، کاربرد کمتری دارد؟
 ۱) PVC (۱) ۲) PA (۲) ۳) PE (۳)
 PES (۶)
- در تورهای گوشگیر ماهیان خاویاری از کدام بک از طناب‌های الیاف طبیعی استفاده می‌شود؟
 ۱) جوتی (۱) ۲) سیزال (۲) ۳) پنبه (۳) ۴) نارگیلی (۴)
- درجه نرمیش و چروکیدگی الیاف، در کدام مرحله از مراحل تولید تور، از اهمیت بالاتری برخوردار است؟
 ۱) اتصال قواره‌های کوچک به یکدیگر (۱)
 ۲) خشک کردن و برش بافتۀ توری (۲)
 ۳) رنگرزی در حمام آب گرم (۳)
 ۴) بافتگی و ایجاد گره (۴)
- در کدام درصد ضربب آویختگی افقی، شکل هر یک از چشمۀ‌های تور آویخته به صورت مربع با زاویۀ تقریباً ۹۰ درجه درمی‌آید؟
 ۱) ۵۰ (۱) ۲) ۶۸ (۲) ۳) ۷۱ (۳) ۴) ۹۰ (۴)
- از بین مواد مصنوعی به منظور تولید بویه‌های صیادی، کدام‌یک چگالی کمتری دارد؟
 ۱) پلی اتیلن (۱) ۲) پلی استایرن منبسط (۲) ۳) پلی پروپیلن (۳) ۴) پلی وینیل الکل فشرده (۴)
- در کاهش طول عمر کاری تورهای ماهیگیری از جنس الیاف مصنوعی، کدام عامل تأثیر مخرب بیشتری دارد؟
 ۱) آلوگی نقی (۱) ۲) باد (۲) ۳) رطوبت (۳) ۴) نور خورشید (۴)
- در آزمایش‌های تشخیص الیاف طبیعی در زیر نور فرابینفس با یک فیلتر سیاه، کدام‌یک از الیاف، دارای خاصیت فلورسانس قوی به رنگ آبی - بنفش هستند؟
 ۱) پنبه (۱) ۲) سیزال (۲) ۳) مانیلا (۳) ۴) نارگیل (۴)
- در بیان ضخامت نخ‌های صیادی، وزن هزارمتر از نخ پایه به گرم، معادل کدام سیستم نمره‌بندی است؟
 ۱) آرتکس (۱) ۲) پوند (۲) ۳) تکس (۳) ۴) متريک (۴)
- در بیان جهت چشمۀ در تورهای صیادی، جهتی که قائم بر جهت کلی امتداد نخ تور است، با کدام علامت اختصاری نشان داده می‌شود؟
 ۱) N (۱) ۲) M (۲) ۳) F (۳) ۴) T (۴)
- الیاف رشته‌ای ناپیوسته، بیشتر از کدام گروه مواد مصنوعی تولید می‌شوند؟
 ۱) پلی استر (۱) ۲) پلی پروپیلن (۲) ۳) پلی وینیل الکل (۳) ۴) پلی وینیل کلراید (۴)
- اگر در سیستم متريک (N_m) نمره نخ پایه ۳۸ باشد، نمره همان نخ در سیستم تکس (Tex) در حدود چقدر است؟
 ۱) ۲۶ (۱) ۲) ۴۲ (۳) ۳) ۵۴ (۴)